

# 営農情報

第9号 平成26年8月9日発行

(水稻営農情報 病害虫防除)

福岡大城農業協同組合  
南筑後普及指導センター

## 1 基本防除

病害虫防除所の調査結果によると、ウンカ類、コブノメイガとも発生量は平年より少ない状況となっています。ただし、秋に坪枯れ被害をもたらすトビイロウンカは、田植え時期やほ場毎の発生の差が大きく、箱施薬剤が施用されたほ場でも、移植後1か月以上経過すると農薬の効果の低下に伴い増殖しやすくなるため、ほ場における発生状況を把握し適期防除を行いましょう。

◎本年は、下表のとおり8月20日から25日頃が防除適期となっておりますので、必ず防除を行って下さい。

品種	剤型	薬剤	希釈倍数
全品種	粉剤	アプロードモンカットスタークルF粉剤DL	4kg
	液剤	アプロードモンカットエアー	1000倍
		スタークル顆粒水溶剤	2000倍
ツクシホマレなど (葉色が濃くコブノメイガ の被害がある場合)	粉剤	アプロードロムダンモンカットF粉剤DL	4kg
	液剤	アプロードロムダンモンカットエアー	750倍

液剤を使用する際の散布水量は、10a当たり100リットルです。

注)ウンカ等への効果を高めるため、防除作業はほ場に水をためた状態で行います。

### 【ほ場でのウンカ発生量の確認方法】

ほ場の四隅から少し中に入り、マクラ地との境目付近を中心に、稲の株元近くを観察して下さい。株を叩いて、水面に落ちた虫を数える方法もあります。

## 2 補正防除

出穂前～出穂期の補正防除は、以下の通りです。いもち病対策のため、必要に応じ補正防除を行って下さい。元気つくしはいもち病にやや弱いため、特に注意してほ場を観察しましょう。

品種	防除時期	薬剤 (全品種とも粉・液いずれか)	希釈倍数
元気つくし	8月16～19日頃	(粉剤)	4kg/10a
ヒノヒカリ	8月25～31日頃	ブラシントレボン粉剤DL	
ツクシホマレ	8月31日～ 9月5日頃	(液剤) ブラシントレボン水和剤	500倍

液剤を使用する際の散布水量は、10a当たり100リットルです。

**農薬の安全使用と飛散防止対策を徹底しましょう!**