

営農情報

第11号 平成27年6月10日発行

(水稻営農情報 病虫害防除)

福岡大城農業協同組合
南筑後普及指導センター

播種作業は5月末から6月初めを中心に行なわれました。出芽・生育はおおむね順調ですが、被覆資材の除去が遅れたことによる徒長が一部で見られます。

徒長気味の苗は活着が遅れることがありますので、浅水管理を心がけて下さい。

1 水管理とスクミリンゴガイ（ジャンボタニシ）対策

中干しまでの水管理は、分げつ促進とジャンボタニシの食害防止のため、浅水管理を基本とします。防除を行う場合は、スクミノンを10a当たり2～4kg、タニシの多いところを狙って散布します。ジャンボタニシは、田植直後～20日後頃に最も激しく食害します。その後は、発生する雑草を食べてくれるという利点もあります。

また、麦わらすき込み田では、ガス害が発生する場合があります。苗が活着する様子がなく、葉が黄色い場合や、ほ場に入ると泡がブクブク出て、ドブのようなにおいがする場合は、ガス害の可能性が高いです。その場合、落水し田面を軽く干して、ガス抜きを行います。

2 除草剤

○雨により初期除草剤を散布できなかつたりして雑草が残っている場合は、中・後期除草剤を使用しましょう。

薬剤名	使用時期	散布量 10a当たり	備考
ワイドアタックSC (液剤)	移植後 20～35日	100ml (水100Lに希釈)	○ヒエ、広葉雑草の両方に効果 ○落水して雑草にかかるよう散布
クリンチャー 1キロ粒剤	移植後 25～35日	1.5kg	○ヒエ5.0葉期までに水をためて散布 ○キシウスズメノヒエに適用あり
ハイカット 1キロ粒剤	移植後15日～ 収穫60日前まで	1kg	○ヒエ3.5葉期までに水をためて散布 ○ヒエ、広葉雑草の両方に効果 ○収穫前日数に注意 ○コウキヤガラに効果あり

3 中干し

- (1) 1株当たりの茎数が20本になり次第、中干しに入ります。目安は、田植の1か月後となります。特に「元気つくし」は倒伏防止のため、中干し開始が遅れないように注意しましょう。中干しの程度は、足跡が軽く付くまで行います。白く乾かないようにしましょう。
- (2) 中干し後は、間断かん水を行います。
- (3) その後、穂ばらみから穂揃期にかけては最も水分が必要な時期なので湛水状態にします。
- (4) 水が豊富にある場合は、高温障害回避のため、出穂後2週間程度かけ流しを行い、ほ場内の温度を下げます。

農薬の安全使用と飛散防止対策を徹底しましょう!