

## 1 生育概況

今年の田植えは、6月20日頃を中心に行なわれました。苗の活着は順調でしたが、日照不足や大雨によりやや軟弱徒長気味の生育となっています。

今後は、ほ場をよく観察し水管理や施肥・防除など、適期作業に努めましょう。

## 2 水管理

(1) 倒伏防止のためには、水管理が最も重要です。必要茎数(20本/株程度)が確保できたら、早めに中干しを実施します。

特に、「元気つくし」の倒伏防止のためには適期中干しが重要です。

(2) 中干し後は、間断かん水を行います。なお、中干しが不十分な所や、葉色が濃く倒伏の恐れのある所では、強めの間断かん水を行ってください。

(3) その後、穂ばらみ期から穂揃期にかけては、最も水分が必要な時期なので水をためます。

## 3 穂肥

穂肥時期の目安と施用量は、以下のとおりです。それぞれのほ場で幼穂長や葉色を観察し、穂肥時期や量を決定します。ただし、水稻基肥一発を使用している場合は穂肥の使用はしないようご注意ください。

品種	第1回目穂肥施用		10a当たり施用量(kg)	
	穂肥時期の目安	幼穂長(mm)	1回目	2回目
元気つくし	8/3頃	5	15	10
ヒノヒカリ	8/10頃	3~5	20	なし
ツクシホマレ	8/13頃	2	25	20

※ 穂肥2回目は、1回目の約1週間後に施用します。

## 4 カメムシ対策

カメムシ対策には、出穂後の農薬による防除を行いますが、発生を抑えるためには、畦畔などの草刈りが重要です。イネの出穂14日前までに畦畔など水田周辺の除草を徹底し、カメムシの住み処を無くしましょう。ただし、イネが出穂してからの除草は、カメムシの水田への飛び込みを助長するので行わないでください。

(裏面に続く)

## 5 病害虫防除

現在、病害虫防除所によるウンカ類の発生予報は「平年並み」となっています。ほ場での発生状況を十分観察し、適期防除に努めてください。

また、育苗期間中に苗いもちが発生したところは、葉いもちの発生に特に注意が必要です。

① 葉いもちの発生を認めたら、下表のとおり早めに防除を行います。

品種	剤型	薬剤	適用病害虫	希釈倍数 (10aあたり使用量)
元気つくし ヒノヒカリ ツクシホマレ	粒剤	コラトップ粒剤5	いもち病	3kg
	ジャンボ剤	コラトップジャンボ		小包装(パック) 10~13個

② 基本防除は、下表のとおり8月中旬ごろに行います。

品種	剤型	薬剤	適用病害虫	希釈倍数 (10aあたり使用量)
元気つくし ヒノヒカリ	粉剤	アプロードモンカットスタークルF粉剤DL	ウンカ類 紋枯病 カメムシ類	4kg/10a
	液剤	アプロードモンカットエアー +スタークル顆粒水溶剤		1000倍 2000倍
ツクシホマレ	粉剤	アプロードロムダンモンカットF粉剤DL		4kg/10a

※ アプロード剤に対するトビイロウンカの感受性が低下しているため、スタークル剤と混用して使用してください。

※ ウンカ類への効果を高めるため、防除作業はほ場に水をためた状態で行います。

③ 出穂前～出穂期の補正防除は、以下の通りです。

元気つくしで、葉いもちが見られる場合は注意しましょう。

品 種	防除時期	薬 剤 (全品種とも粉・液いずれか)	適用病害虫	希釈倍数 (10aあたり使用量)
元気つくし	8月16~21日頃	(粉剤) ブラシントレボン 粉剤DL	いもち病 ウンカ類	4kg/10a
ヒノヒカリ	8月25~31日頃			
ツクシホマレ	8月31日~ 9月5日頃	(液剤) ブラシントレボン 水和剤	カメムシ類	500倍

注) 液剤を使用する際の散布水量は、10aあたり100リットルです。

**農薬の安全使用と飛散防止対策を徹底しましょう!**