

◆農薬の登録内容は随時更新されますので使用する際は、包装容器や袋に記載されている有効期限および登録内容を確認して下さい

◆農薬使用基準の遵守 ◆農薬飛散防止に努めましょう ◆農薬購入の際は印鑑を持参して下さい ◆麦ワラは、焼却せず全量すき込みましょう

田まわりを実施し、生育を把握しましょう ◆良食味米生産のため施肥基準を守りましょう

●J A 福 岡 大 城
●大 川 市 ・ 久 留 米 市 ・ 大 木 町
●南 筑 後 ・ 久 留 米 普 及 指 導 セ ン タ ー
令和4年2月作成

水 稲 (令和4年産)

作業日誌年間作業記録 (JA米生産基準)

JA福岡大城

産地名 JA福岡大城

生産者名 〇〇農事組合()

集落営組織名()

電話番号

住 所 福岡県

番地

項 目	品 種	作付面積	数 量	購入先	購入年月日
種子購入		a	kg	JA	月 日
		a	kg	JA	月 日
		a	箱	JA	月 日
共同育苗購入		a		共同育苗	月 日
		a	箱	その他	月 日
		a			

收穫時期	月 日 ~ 日	個人・共同・委託(委託先名:)
------	---------	------------------

收穫時期	月 日 ~ 日	個人・共同・委託(委託先名:)
------	---------	------------------

※ 提出はカントリー出荷時にお願い致します。

【消費者が何を望むか】 “消費者・市場重視で考えよう” JA確認者

生産者自己点検チェックシート 記入日 月 日

集落営農組織名 () 集落名 ()

JA米生産者用(令和4年産) 氏名 _____ (印)

関連各項目	チェック項目	結果(いずれかに○)
-------	--------	------------

キ
リ
ト
リ
セ
ン

水管理

[illegible][illegible]

--	--

主要成分 (100 份中)	溶解特性	溶解 (在 1 份)	溶解 (在 1 份)
---------------	------	------------	------------

除 草 剂 名	散 布 量	使 用 时 期
---------	-------	---------

除 草 剤 名	散 布 量		使 用 時 期	注 意 事 項
サラブレッドKAI	1キ口粒剤	1kg	移植時または移植直後～ノビエ2.5葉期	散布に当たっては、水の出入りを止め湛水状態(水深3～5cm)で均一に散布する
	フロアブル	500mL		
	ジャンボ	10/パック	移植直後～ノビエ2.5葉期	散布に当たっては、水の出入りを止め湛水状態(水深5～6cm)で均一に散布する
ガ ン ガ ン	1キ口粒剤	1kg	移植時または移植直後～ノビエ3葉期	散布に当たっては、水の出入りを止め湛水状態(水深3～5cm)で均一に散布する
	ジャンボ	10/パック	移植後3日～ノビエ2.5葉期	散布に当たっては、水の出入りを止め湛水状態(水深5～6cm)で均一に散布する
ドラゴンホークZ	1キ口粒剤	1kg	移植時または移植直後～ノビエ3葉期	散布に当たっては、水の出入りを止め湛水状態(水深3～5cm)で均一に散布する
	フロアブル	500mL	移植後3日～ノビエ3葉期	
	ジャンボ	10/パック	移植後3日～ノビエ3葉期	散布に当たっては、水の出入りを止め湛水状態(水深5～6cm)で均一に散布する

品 種 名	1回目			2回目
	目 安	葉 色 (葉色版による)	幼穂長 (mm)	
元 気 つ く し	出穂の16日頃前	3.5～4.0	5	1回目の 7日後
ヒ ノ ヒ カ リ	出穂の18日頃前	3.5～4.0	3～5	施用しない (1回のみ)
ツクシホマレ	出穂の22～20日前	4.0～4.5	2	1回目の 7～10日後

中・後期除草剤(ヒエ、広葉雑草対策)(10a当り)