

大豆栽培情報（9月号）

令和6年9月4日
福岡大城農業協同組合
南筑後・久留米普及指導センター

播種の時期が、7月5-9日頃と7月20日前後との2つのグループに分かれているため、生育状況に大きな差が見られます。開花期は、7月5日播種ほ場で8月21日頃、7月22日播種ほ場で8月28日頃です。病害虫の防除適期は、開花後の20~30日後です。播種時期の違いで開花期に差があるため、大豆の生育を確認し、適期防除に努めてください。

【2回目の防除/9月中下旬（開花後20~30日後）3種混合】

	農薬名	希釈倍率/10a 当り使用量	収穫前日数	対象病害虫
液剤 /乗用 管理機	プレオアブルまたは プレバソアブル5	1000~2000倍 /100~300L	7日前まで	ハモヨトリ
		4000倍 /100~300L		
	スタークル顆粒水溶剤	2000倍 /100~300L	7日前まで	カメムシ類
	トップジンM水和剤	700~1500倍 /100~300L	14日前まで	紫斑病
無人 航空機	プレオアブルまたは プレバソアブル5	8~16倍 /0.8L	7日前まで	ハモヨトリ
		16~32倍 /0.8L		
	スタークル液剤 10	8倍 /0.8L	7日前まで	カメムシ類
	トップジンMゾル	5倍 /0.8L	14日前まで	紫斑病

!!注!! 無人航空機防除体系では、薬剤の沈殿を避けるため、混用順に気を付け、使用直前に混合する。（暦参照）

【補正防除/多発時（3種混合防除の10~20日後頃）】

3種混合防除後にほ場での多発生を認めたら、発生している害虫に応じ、以下から薬剤を選定して補正防除を実施します。

	対象病害虫	農薬名	希釈倍率/10a 当り使用量	収穫前日数
液剤 /乗用 管理機	カメムシ類	スタークル顆粒水溶剤 またはキップアブル	2000倍 /100~300L	7日前まで
	ハモヨトリ	グレーシア乳剤	2000~3000倍 /100~300L	14日前まで
無人 航空機	カメムシ類	スタークル液剤 10 またはキップアブル	8倍 /0.8L	7日前まで
			16倍 /0.8L	

☆農作業時の熱中症に注意しましょう!!

- 日中の気温の高い時間を避け、涼しい時間帯に作業●こまめな休息と水分補給
- 【農薬の安全使用上の注意】①散布前に必ず農薬ラベルの登録内容等を確認！
- ②散布時には近隣作物や住宅街への飛散防止対策を徹底！ ③散布後は必ず散布器具（タンク、ホース等）を洗浄！ ④防除履歴の正確な記帳！